

## ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1. Θέλουμε να αξιολογήσουμε αισθητηριακή διάκριση και πραξία σε ένα παιδί. Ποιο τεστ θεωρείτε ότι είναι το πιο κατάλληλο για να χρησιμοποιήσουμε;

A. GMPPM

B. SIPT

C. PEDI

D. Movement ABC

2. Σε περίπτωση παιδιού με υπό-αποκριτικότητα, η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει:

	Σωστό	Λάθος
Εν τω βάθει πίεση		
Αργό λίκνισμα		
Ασκήσεις αντίστασης		
Ηχηρή ομιλία		
Ερεθίσματα που περιλαμβάνουν αντίθετες θερμοκρασίες		

3. Σημειώστε ποιες προτάσεις από τις πιο κάτω είναι σωστές και ποιες λάθος.

		Σωστό	Λάθος
1.	Για το διάβασμα απαιτούνται οι σακκαδικές κινήσεις.		
2.	Όταν ο καρπός βρίσκεται σε πλήρη έκταση υπάρχει αδυναμία σύλληψης		
3.	Τους χάρτες της φυσιολογικής ανάπτυξης δεν τους χρησιμοποιούμε για την αξιολόγηση των παιδιών και το σχεδιασμό θεραπευτικών προγραμμάτων.		
4.	Σύμφωνα με το DSM-V τα παιδιά που παρουσιάζουν Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού ποτέ δεν παρουσιάζουν Νοητική Υστέρηση.		

4. Ο νάρθηκας που έχει φτιαχτεί από τον ορθωτικό μετά από εφαρμογή του στο παιδί δείχνει ότι έχει δημιουργήσει ερεθισμό στο δέρμα του. Ο ερεθισμός διαρκεί ακόμα σαράντα λεπτά μετά την αφαίρεση του νάρθηκα. Ο εργοθεραπευτής καλείται να:

A. συστήσει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον νάρθηκα μέχρι να σκληρύνει το δέρμα.

B. να βάλει μαλακό υπόστρωμα στο εσωτερικό του νάρθηκα που να αντιστοιχεί στο σημείο πίεσης.

Γ. να σημειώσει στο νάρθηκα το σημείο της πίεσης και να ζητήσει την τροποποίηση του από τον ορθωτικό.

Δ. να αφήσει τον νάρθηκα εκτός εφαρμογής και να τον ξαναεφαρμόσει μόλις φύγει ο ερεθισμός.